

### Enfermedad de Crohn

#### Tipos de enfermedad de Crohn:

Los síntomas y complicaciones posibles de la enfermedad de Crohn varían, dependiendo de qué parte del tracto GI se ve afectada. Los cinco tipos de enfermedad de Crohn son:

- **Colitis de Crohn (granulomatosa):** afecta solamente el colon.
- **Enfermedad de Crohn gastroduodenal:** afecta el estómago y el duodeno (la primera parte del intestino delgado).
- **Ileítis:** afecta el íleon (la última sección del intestino delgado).
- **Ileocolitis:** es la forma más común de la enfermedad que afecta el colon y el íleon
- **Yeyunoleítis:** produce parches desiguales de inflamación en el yeyuno (la mitad superior del intestino delgado).

### Patrón de la Enfermedad

- **Enfermedad de Crohn obstructiva/fibroestenosante:** por lo general sigue un patrón de brotes (o activaciones) y remisiones de manera crónica. Se caracteriza por la constricción o estrechamiento del intestino.
- **Enfermedad de Crohn luminal:** se refiere a aquella que causa cambios inflamatorios en el lumen o tubo del intestino.
- **Enfermedad de Crohn fistulante:** las fistulas son canales anormales entre dos bucles del intestino, o entre el intestino y otra estructura (como la vagina, la vejiga o la piel). En la enfermedad de Crohn, el riesgo de desarrollar fistulas es de un 20% a un 40%. La probabilidad de desarrollar este patrón fistulante de enfermedad depende del lugar y complejidad de las fistulas.

### Complicaciones y Diagnóstico

- **Fístula:** La inflamación puede provocar la formación de úlceras dentro de la pared del intestino u otros órganos. Estas úlceras se pueden extender por todo el grosor de la pared de la víscera y formar un túnel (fístula) hacia otra parte del intestino, entre el intestino y otro órgano, o hacia la superficie de la piel.
- **Estenosis:** Es el estrechamiento de una sección del intestino causada por cicatrización y que puede llevar a la oclusión intestinal.
- **Absceso:** Es una acumulación de pus que se puede desarrollar en el abdomen, la pelvis, o alrededor de la zona anal.
- **Intestino perforado:** La inflamación crónica debilita tanto la pared del intestino que se puede llegar a hacer un hoyo.
- **Malabsorción y desnutrición.**
- **Deficiencias nutricionales:** Se pueden desarrollar debido a la incapacidad de absorber nutrientes como las proteínas, vitaminas y grasas.

*\*Por favor consulte a su médico para conocer otras posibles complicaciones.*

